УЧИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ОТВЕТЫ НА «ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ»
ВОПРОСЫ

Вы, несомненно, знаете, что 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Она стала событием большого общественно-политического значения, и это наложило определенный отпечаток на ход расследования ее причин. Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии менялся с течением времени, и единого мнения нет до сих пор. Есть различные версии относительно тех физических процессов, которые происходили в реакторе в те роковые секунды. Но, расходясь в деталях, специалисты единодушны в одном: причина аварии – в техническом несовершенстве конструкций реактора в сочетании с недостатком «культуры безопасности», то есть пренебрежении к вопросам безопасности на всех этапах: как строительства, разработки технических регламентов, эксплуатации станции, так и в ходе событий роковой ночи 26 апреля.

После взрыва реактор оказался полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, в том числе изотопов йода, цезия, стронция, плутония.

Чернобыльская авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Основной радиационный удар пришелся на Беларусь. Из 30-километровой зоны было экстренно эвакуировано более 24 тысяч человек. Всего с момента аварии на ЧАЭС с загрязненных территорий эвакуированы и отселены 138 тысяч человек, около 200 тысяч самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения. Более 470 населенных пунктов исчезло с карты страны.

В результате катастрофы на ЧАЭС радиоактивному загрязнению Cs-137 с плотностью более 1 Ки/км² подверглась территория Беларуси площадью 46,45 тыс. км² (23,5% всех земель, 59 из 118 районов), на которой проживала почти четверть населения республики. 21 район нашей страны и сегодня относится к наиболее пострадавшим.

ДЛЯ лучшего понимания радиологических величин и единиц измерения приведем их краткую характеристику.

Активность – величина, которая одновременно характеризует количество радионуклидов в образце, число происходящих в нем ядерных превращений, обычно – распадов за единицу времени и интенсивность испускаемого излучения. В качестве единицы активности принято одно ядерное превращение в секунду, т. е. один распад в секунду. В системе СИ эта единица названа **беккерель (Бк)**.

Кюри (Ки) – внесистемная единица активности. 1 кюри – это большая величина, она равна $3,7 \times 10^{10}$ Бк, что соответствует такому же числу ядерных распадов в секунду. За 1 Ки принята активность одного грамма радия-226. Например, масса цезия-137 с активностью 1 Ки составляет 11,5 мг.

Несмотря на то, что кюри – это внесистемная единица, она широко используется на практике.

Плотность загрязнения территории (почвы) или поверхностная активность – активность техногенных радионуклидов, например чернобыльского происхождения, выпавших на единицу площади; выражается в килобеккерелях на метр квадратный (кБк/м²) или кюри на километр квадратный (Ки/км²). $1 \text{ Ки/км}^2 = 37 \text{ кБк/м}^2$.

Доза облучения – понятие, используемое для количественной оценки степени воздействия радиации на организм человека.

Доза поглощенная – величина энергии ионизирующего излучения, переданная облучаемому телу, веществу.

Мощность дозы (интенсивность облучения) – величина, характеризующая дозу, полученную за единицу времени.

Доза эквивалентная – поглощенная доза в органе или ткани с учетом соответствующего взвешивающего коэффициента для данного вида излучения, отражающего способность излучения повреждать ткани организма.

Эффективная доза облучения – мера риска возникновения отдаленных последствий облучения (стохастических эффектов) организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Этот показатель широко используется в нормативных правовых документах по радиационной безопасности.

Основные дозиметрические величины и единицы			
Величина	Наименование и обозначение единицы измерения		Соотношения между единицами
	Внесистемные	СИ	
Активность нуклида, A	Кюри (Ки, Ci)	Беккерель (Бк, Bq)	1 Ки = $3,7 \times 10^{10}$ Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк = $2,7 \times 10^{-11}$ Ки
Поглощенная доза, D	Рад (рад, rad)	Грей (Гр, Gy)	1 рад = 0,01 Гр 1 Гр = 1 Дж/кг
Эквивалентная доза, H; Эффективная доза, E	Бэр (бэр, rem)	Зиверт (Зв, Sv)	1 бэр = 0,01 Зв 1 Зв = 100 бэр

Число падающих яблок за определенное время можно сравнить с активностью в **Беккерелях** (количество распадов в секунду для любого радионуклида)

Число яблок, которые упали на спящего, можно сравнить с поглощенной дозой в **Греях** (поглощенная доза – количество энергии ионизирующего излучения, поглощенной единицей массы какого-либо физического тела, например, тканями организма)

Эффект на тело с учетом размера или массы яблок, а также мест их попадания, можно сравнить с эффективной дозой в **Зивертах** (эффективная доза учитывает как неодинаковую радиационную чувствительность каждого органа или ткани, так и тип ионизирующего излучения. Специалистами используется также эквивалентная доза, которая вводится для отдельного органа или ткани и учитывает только тип излучения)

СРЕДИ природных экосистем в результате радиоактивного загрязнения наиболее пострадал лесной фонд. В различной степени оказались загрязнены 53 из 95 лесхозов отрасли.

Государственное научное учреждение «Институт леса Национальной академии наук Беларуси»;
<http://www.forinst.basnet.by/>

За прошедшие после катастрофы годы вследствие радиоактивного распада территория радиоактивного загрязнения **сократилась с 23,5 до 14,5%** от общей площади Республики Беларусь. На текущий момент площадь загрязненной территории Гомельской области составляет 18,33 тыс. км², Могилевской — 7,88 тыс. км², Брестской — 2,37 тыс. км². По данным на начало 2015 г. на загрязненных территориях проживало 1 142 600 граждан Беларуси (в том числе 215 500 детей).

Экономический ущерб, нанесенный аварией нашей стране, оценивается в **235 миллиардов долларов США** в расчете на **30-летний период** ее преодоления.

НА пострадавшей территории, в зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами, выделяют следующие зоны радиоактивного загрязнения:

1) **зона проживания с периодическим радиационным контролем** — территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами Cs-137 от 1 до 5 Ки/км²;

2) **зона с правом на отселение** — территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами Cs-137 от 5 до 15 Ки/км²;

3) **зона последующего отселения** — территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами Cs-137 от 15 до 40 Ки/км²;

4) **зона первоочередного отселения** — территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами Cs-137 от 40 Ки/км² и более;

5) **зона эвакуации (отчуждения)** — территория вокруг Чернобыльской АЭС, с которой в 1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона).

Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, утверждается и пересматривается Советом Министров Республики Беларусь в зависимости от изменения радиационной обстановки не реже одного раза в 5 лет.

Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»; <http://rad.org.by/>

КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Брестская
область:**
Лунинецкий район
Пинский район
Столинский район

РАДИОАКТИВНЫМ ЦЕЗИЕМ-137 (ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД)

Могилевская область:

Быховский район
Костюковичский район
Краснопольский район
Славгородский район
Чериковский район

Гомельская область:

Брагинский район
Буда-Кошелевский район
Ветковский район
Добрушский район
Ельский район
Калинковичский район
Кормянский район
Лельчицкий район
Наровлянский район
Речицкий район
Рогачевский район
Хойникский район
Чечерский район

Человек может подвергаться облучению от источников излучения, находящихся вне организма, — и в этом случае говорят **о внешнем облучении**, а может облучаться радионуклидами, попавшими в его организм с вдыхаемым воздухом, потребляемой пищей и водой, — и тогда говорят **о внутреннем облучении** человеческого организма.

Основная доза облучения населения в послеаварийный период была получена за счет:

Что такое «йодный период» 1986 года?

ПРИ аварии на Чернобыльской АЭС произошел выброс в окружающую среду радиоизотопов йода. В первые недели после катастрофы за счет короткоживущих изотопов, прежде всего йода-129–135, практически на всей территории Беларуси регистрировалось значительное увеличение мощности дозы гамма-излучения. В некоторых населенных пунктах она достигала 500 мкЗв/час, что приблизительно в 2000 раз выше естественного радиационного фона. Уровни радиоактивного загрязнения короткоживущими радионуклидами йода во многих регионах республики были настолько велики, что вызванное ими облучение миллионов людей получило название «йодного удара». В апреле–мае 1986 года наибольшие уровни выпадения радионуклидов йода имели место в Брагинском, Хойникском и Наровлянском (до 1000 Ки/км²), а также в Чечерском, Кормянском, Буда-Кошелевском и Добрушском (до 500 Ки/км²) районах Гомельской области. Продолжительность «йодного периода» составила три месяца.

НЕГАТИВНОЕ воздействие на здоровье населения в наибольшей степени оказал йод-131 (период полураспада 8 суток). Действие

данного радионуклида заключается в том, что он избирательно накапливается в клетках (тироцитах) щитовидной железы, облучает их и может спровоцировать ряд

заболеваний данного органа (тиреоидит, узловой зоб, рак щитовидной железы). При этом в ранний период после аварии на АЭС большую опасность представляет ингаляционное поступление радионуклидов йода, а в более поздний период – поступление радиоактивного йода при употреблении в пищу молока и молочных продуктов от животных, выпасаемых на загрязненных радиоактивным

йодом пастбищах, а также поверхностно загрязненной листовой зелени. Дети получили дозу, которая была гораздо выше дозы, полученной взрослыми.

Это связано с тем, что у детей уровень обмена веществ и скорость деления клеток на порядок выше, чем у взрослых. Поэтому, если до аварии на 2,5 миллиона белорусских детей приходилось один–три случая рака щитовидной железы в год, то уже через пять лет после аварии был зафиксирован статистически значимый рост заболеваемости детей этим видом рака.

СПОНТАННЫЙ уровень заболеваемости у людей, не подвергшихся облучению йодом-131, остается низким и сопоставим с доаварийным. Риск заболеть раком щитовидной железы у детей, которые родились в 1987 году, такой же как до катастрофы на Чернобыльской АЭС, поскольку радиоактивный йод распался в течение первых трех месяцев после аварии.

Таким образом, основные последствия чернобыльской аварии для здоровья заключались в повышенном уровне заболеваемости раком щитовидной железы у детей и подростков (возраст которых в 1986 году был от нуля до 18 лет).

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
<http://minzdrav.gov.by/>

Что такое проведение йодной профилактики?

НАИБОЛЕЕ эффективным методом защиты щитовидной железы от радиоактивного йода является прием внутрь препаратов стабильного

йода (т. н. блокирование щитовидной железы). Принимать препараты йода необходимо в ранние сроки после аварии.

Прием препаратов йода через 1 час способствует снижению дозы облучения щитовидной железы на 90%, через 3 часа – на

60%, через 6 часов – на 50%. Защитный эффект однократного приема йодистого калия длится 24 часа. Таким образом, йодная профилактика эффективна только в первые дни и недели после радиационной аварии, поскольку период полураспада радиоактивного йода-131 составляет 8 суток. По истечении 10 и более периодов полураспада (т. е. 2–3 месяцев), йод-131 уже не представляет опасности, т. к. почти весь распадается, и, соответственно, нет смысла в приеме препаратов стабильного йода. Что касается всплеск ажиотажа к препаратам йода, то они, как правило, связаны со слухами среди населения о якобы произошедших утечках радиоактивных веществ на атомных станциях.

Заболееваемость радиационно-индуцированным раком щитовидной железы может быть предотвращена или значительно снижена при своевременном проведении следующих защитных мероприятий:

- укрытие населения в зданиях;
- блокирование щитовидной железы препаратами стабильного йода;
- предотвращение потребления загрязненных продуктов питания;
- эвакуация.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, после того как короткоживущие радионуклиды распались, **основным источником** внешнего и внутреннего облучения от радионуклидов чернобыльского происхождения является долгоживущий радиоактивный **цезий-137**. Период полураспада цезия-137, как и стронция-90 (выпавшего в основном в ближней к ЧАЭС зоне), составляет **около 30 лет**. Вклад **стронция-90** в дозу внутреннего облучения населения невелик.

Следует отметить, что средние дозы облучения, полученные лицами, постоянно проживающими на территориях, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, оказываются более низкими, чем дозы, полученные лицами, проживающими в районах с высоким естественным фоновым излучением: в Индии, Иране, Бразилии и Китае. Население, постоянно проживающее в этих районах, получает от радиоактивных элементов в почве дозу свыше 25 мЗв в год без каких-либо явных последствий для здоровья. Содержание радионуклидов повышено в породах вулканического происхождения (гранит, базальт), меньше радионуклидов в осадочных породах (известняк, песчаник). Наиболее высокие уровни земной радиации наблюдаются на пляжах морского курорта Гуарапари в Бразилии, а также на юго-западе Индии, где есть богатые торием пески. Места с высоким уровнем радиации есть во Франции, в Скандинавских странах и Англии.

2,4 мЗв/год — средняя годовая доза от радиационного фона за счет **естественных источников** ионизирующего излучения (средние данные для северного полушария).

ЕСТЕСТВЕННАЯ радиация является неотъемлемым фактором окружающей среды. Все живые организмы в процессе эволюции адаптировались к слабому излучению. При этом достоверно установлено стимулирующее действие малых доз ионизирующих излучений на биологические процессы. Это явление известно как **радиационный гормезис**. Учеными сделан вывод о том, что радиация — физиологически значимый фактор роста и развития всего живого. Ряд специальных опытов показал, что живые организмы (растения, млекопитающие), искусственно помещенные в условия с пониженным радиационным фоном, чувствовали заметное угнетение, снижение многих жизненных функций.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ экспериментальные исследования по изучению биологического действия ионизирующего излучения показали, что вероятность отрицательных последствий для здоровья **зависит от величины дозы** облучения — энергии, поглощенной телом человека. Чем больше энергии передаст излучение тканям, тем больше повреждений оно может вызвать в организме. Таким образом, величина дозы является мерой воздействия радиации на человека и возможных последствий для здоровья.

Радиационный фон — это ионизирующее излучение от природных источников космического и земного происхождения, а также от искусственных радионуклидов, рассеянных в окружающей среде, и других источников излучения, возникших в результате деятельности человека, прежде всего — рентгеновского оборудования и медицинских диагностических исследований с использованием радиоизотопов.

Источники излучения подразделяются на естественные и искусственные:

— **Естественные (природные)** — космическое излучение; радионуклиды, содержащиеся в земной коре, горных породах, воде, воздухе и т. д.

— **Искусственные (техногенные)** — медицина, ядерные испытания, атомная энергетика, радиоактивные отходы и др.

Средние мировые данные по вкладу различных источников радиации в общую дозу, получаемую среднестатистическим жителем Земли

Эффективные дозы облучения и вызываемые ими последствия

свыше 5000 мЗв

Тяжелая степень острой лучевой болезни
(смерть наступает в течение нескольких недель)

свыше 2500 мЗв

Средняя степень острой лучевой болезни
(50% шансов на выживание
после воздействия)

свыше 1000 мЗв

Легкая степень острой
лучевой болезни
(слабость, головная боль,
тошнота, рвота)

200 мЗв

Порог развития злокачественных
новообразований

10 мЗв

Компьютерная томография

2,4 мЗв

Годовая доза за счет
естественного (природного)
радиационного фона

0,39 мЗв — космическое
излучение

0,29 мЗв — продукты питания

0,48 мЗв — почва и горные
породы

1,26 мЗв — радон в воздухе

0,2 мЗв

Рентген грудной клетки

0,05 мЗв

Годовые дозы в районе АЭС
(измеряемый уровень намного ниже)

0,01 мЗв

Доза облучения во время
рентген-диагностики зубов

Малые (низкие) дозы

СУЩЕСТВУЮТ два вида эффектов, вызываемых радиацией:

— **Детерминированные эффекты**, связанные с гибелью или потерей функций клеток при больших дозах облучения. Эти эффекты имеют обычно дозовый порог. С увеличением дозы тяжесть эффектов возрастает. Примерами таких эффектов является острая лучевая болезнь и местные лучевые поражения.

— **Стохастические эффекты**, связанные с увеличением частоты злокачественных новообразований у людей, подвергшихся радиационному воздействию. Вероятность возникновения данного вида эффектов повышается при более высоких дозах облучения, а тяжесть их проявления (если оно имеет место) не зависит от дозы. Выявить такие эффекты у людей, облученных в дозах менее 200 мЗв, не удастся.

Государственное учреждение
«Республиканский научно-
практический центр радиационной
медицины и экологии человека»;
<http://www.rcrm.by/>

В 2000 году в Республике Беларусь создана **Единая система контроля и учета индивидуальных доз облучения населения.**

Согласно «Каталогу средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь, расположенных на территории радиоактивного загрязнения», разработанному Республиканским научно-практическим центром радиационной медицины и экологии человека в 2015 году, среднегодовая эффективная доза может превысить 1 мЗв в 82 населенных пунктах. Ни в одном из населенных пунктов доза облучения **не превышает 3 мЗв/год.**

Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 05.01.1998 г. № 122-3 устанавливаются следующие допустимые пределы доз облучения в результате воздействия источников ионизирующего излучения, не включая естественный и искусственный радиационный фон:

- для населения **средняя годовая эффективная доза – 1 мЗв,**
- для профессионалов, работающих с источниками излучения, **– 20 мЗв.**

Безопасное проживание на загрязненных территориях

21 РАЙОН Гомельской, Могилевской и Брестской областей Республики Беларусь относится к наиболее пострадавшим после аварии на ЧАЭС. При проведении защитных мероприятий радиационный риск на этих территориях сводится к минимуму.

К мерам по защите населения относят:

- радиационный мониторинг и контроль загрязненных территорий;
- дезактивация загрязненной местности;
- ограничение пребывания людей в местах с повышенным радиационным фоном;
- перевод сельскохозяйственных животных на незагрязненные пастбища;
- ограничение и контроль потребления тех или иных пищевых продуктов;
- соблюдение населением правил личной гигиены.

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии»;
<http://www.rir.by/>

РАДИОАКТИВНОЕ

загрязнение продуктов питания относится к числу ведущих факторов, от которых зависит степень радиационной опасности. Предельно допустимые уровни радиоактивного загрязнения устанавливаются для контроля содержания радионуклидов в продуктах питания человека, в различных кормах для сельскохозяйственных животных.

Основной путь поступления радионуклидов в организм человека – пищевые цепочки:

Для радиационной защиты, то есть снижения облучения населения, были созданы системы **радиационного контроля продуктов питания** и учета индивидуальных доз облучения пострадавшего населения, а также введены **правила ведения сельского и лесного хозяйств** на загрязненных территориях.

Защитить организм от попадания радионуклидов, поступающих с пищей, можно на трех этапах:

1. При получении сельхозпродукции.
2. При приготовлении пищи.
3. При употреблении в пищу продуктов, способствующих связыванию и выведению радиоактивных веществ.

По способности накапливать цезий-137 основные **овощные культуры** располагаются следующим образом (в порядке убывания):

щавель, салат, фасоль, бобы, горох, редис, морковь, свекла, картофель, чеснок, сладкий перец, лук, помидоры, кабачки, огурцы, капуста (первые накапливают радионуклиды в 10–15 раз больше, чем последние).

ТАКИЕ ягоды, как черника, брусника, черная и красная смородина, клюква, более интенсивно накапливают радионуклиды, а земляника, белая смородина, малина и рябина – менее интенсивно.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия;
<http://www.mshp.minsk.by/>

СРЕДИ грибов больше всего радионуклидов накапливают польский гриб, краснушка, моховик желто-бурый, рыжик, масленок осенний (особенно поздний) и др. В наименьшей степени радионуклиды накапливают шампиньон, опенок осенний, вешенка, опенок зимний и др.

Различные способы приготовления пищи могут приводить как к снижению (варка, вымачивание), так и к концентрированию (сушка, вяление) радионуклидов в готовых к употреблению продуктах.

ДЛЯ снижения содержания радионуклидов в продуктах питания необходимо:

- тщательно промывать в проточной воде овощи, фрукты, грибы и ягоды;
- вымачивать мясо диких животных и птиц в воде с добавлением уксуса с последующим отвариванием;
- предварительно отваривать рыбу, мясо диких животных и птиц на протяжении 10–15 минут с последующим сливанием бульона;
- удалять верхний слой с овощей и фруктов;
- вымачивать грибы не менее двух часов;
- отваривать грибы, многократно меняя воду.

Правильное питание повышает устойчивость организма к воздействию радиации и других вредных экологических факторов. Необходимо употреблять в пищу продукты:

- **богатые йодом** (морская капуста, рыба, креветки, кальмары);
- **богатые клетчаткой** (хлебопродукты из муки грубого помола);
- **содержащие калий** (картофель, сухофрукты, огородная зелень, бобовые);
- **содержащие пектины** (овощи, фрукты, соки с мякотью).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1. СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМ

1.1. Ограничение и/или исключение из рациона продуктов питания (в том числе местных), накапливающих радионуклиды в значительных количествах (особенно лесных: грибов и ягод).

1.2. Кулинарная и технологическая обработка продуктов питания.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ

2.1. Принцип конкурентного замещения:

– продукты, богатые калием (картофель, сухофрукты, фасоль, горох), снижают поступление в организм **радиоактивного цезия**;

– продукты, богатые кальцием (молоко, творог, яйца, бобовые), снижают поступление в организм **радиоактивного стронция**;

– йодосодержащие препараты на ранней стадии аварии блокируют поступление **радиоактивного йода** в щитовидную железу.

2.2. Принцип связывания радионуклидов в желудочно-кишечном тракте:

– продукты, богатые пектинами (овощи, фрукты и ягоды: свекла, морковь, тыква, перец сладкий,

баклажан, яблоко, груша, вишня, слива, облепиха, крыжовник, смородина, арбуз), способствуют выведению радионуклидов из организма.

3. УСКОРЕНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ОРГАНИЗМА

Выведение радионуклидов из организма ускоряется за счет употребления продуктов, богатых клетчаткой (зерновые, овощи, фрукты), которые усиливают перистальтику кишечника.

4. СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА ОРГАНИЗМ

4.1. насыщение организма антиоксидантами, которые препятствуют перекисному окислению липидов, усиливающемуся под влиянием излучения.

4.2. насыщение организма микроэлементами.

4.3. Правильный режим питания.

4.4. Повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма (соблюдение режима труда и отдыха, прием адаптогенов, уменьшение психологической дезадаптации, массаж, гидротерапия, теплогрязелечение, витаминпрофилактика).

Как уже неоднократно отмечалось, средние дозы, получаемые населением загрязненных территорий, в том числе за счет потребления содержащих радионуклиды продуктов питания невелики. Они соизмеримы с дозами фонового облучения. Поэтому последняя группа рекомендаций важна, скорее в общем плане снижения воздействия различных негативных факторов на здоровье человека.

ОДНАКО несмотря на большой прогресс, которого добилась Беларусь в области улучшения обстановки на пострадавших территориях за почти тридцатилетний промежуток времени, мышление и восприятие многих людей осталось в плену «чернобыльской мифологии» и стереотипов, застряв в прошлом. Сегодня «чернобыльская мифология» (как и любая другая) формирует отношение общества к миру и действительности, в частности, к радиации как таковой, государству, атомной энергетике в целом.

СУЩЕСТВУЕТ несколько групп «чернобыльских» мифов:

– мифы об опасности проживания на территории радиоактивного загрязнения (когда люди упорно цепляются за радиационный фактор, делая его виновным в нарушении любых функций организма, и, при этом, часто забывают об элементарной необходимости соблюдения нехитрых правил здорового образа жизни);

ЗДОРОВЬЕ, согласно определению ВОЗ, – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. От факторов окружающей среды здоровье современного человека зависит примерно на 15%. Условия проживания и образ жизни человека дают наибольший вклад в здоровье – около 60%. Это так

называемые поведенческие факторы: питание, вредные привычки, физическая активность и др. Вклад наследственных факторов в здоровье оценивается в 15%, еще 10% дает здравоохранение. Не следует забывать, что наша жизнь неизбежно связана с рисками для здоровья и жизни. Среди причин инвалидности и смертности людей лидируют курение, употребление алкоголя, переедание, депрессия, а отнюдь не пресловутый радиационный фактор.

– мифы о радиологическом качестве продуктов, произведенных на загрязненных территориях (когда люди забывают о том, что предприятиям перерабатывающей промышленности необходимо соблюдать нормированное радиологическое качество продуктов);

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

создана и четко работает трехуровневая система радиационного контроля.

Первый уровень – государственный контроль и надзор за соблюдением всеми предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами норм радиационной безопасности, который осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Государственный надзор за правильностью проведения измерений, аккредитацию подразделений радиационного контроля осуществляет Госстандарт.

Второй уровень – ведомственный контроль. Заинтересованные министерства имеют сеть лабораторий, осуществляющих радиационный контроль продукции, за качество которой они отвечают: Министерство сельского хозяйства и продовольствия – контроль сельскохозяйственного сырья и производимой из него продукции; Министерство лесного хозяйства – контроль лесного фонда, лесной продукции (включая дары леса) и продуктов ее переработки; Министерство

жилищно-коммунального хозяйства – контроль качества воды.

Третий уровень – общественный контроль, осуществляемый общественными и независимыми организациями.

Проба с превышением установленных нормативов может стать причиной запрета на производство данного вида продукции и даже закрытия всего предприятия. Именно поэтому на каждом предприятии внедрена система трехступенчатого радиационного контроля: входной контроль сырья; промежуточный контроль продукции; итоговый контроль готовой продукции, которая ни в коем случае не может превышать Республиканские допустимые уровни (РДУ) по содержанию радионуклидов.

Помимо того, гигиенические нормативы по содержанию радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде в Республике Беларусь одни из самых жестких в мире. И, например, молоко, которое в Норвегии будут давать детям, в нашей стране не дойдет даже до завода.

– мифы, формирующие искаженное представление о загрязненных радионуклидами территориях, об их культурном и природном потенциале (когда люди неверно отождествляют понятия «зона» и «пострадавшая территория»; когда те, кто никогда не бывал на загрязненных радионуклидами территориях, утверждают, что вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС были уничтожены все архитектурные и природные достопримечательности, а культура и традиции этих земель утрачены);

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«зоной», в ее общепризнанном и объективном понимании, можно считать лишь территорию зон отчуждения и отселения: доступ туда ограничен, а хозяйственная деятельность не ведется. На остальных территориях живут более 1,1 млн. человек, растут более 200 тыс. детей и подростков, работают предприятия и собирают урожай.

В каждом из пострадавших районов есть немало достопримечательностей, способных вызвать интерес даже у искусственного путешественника. Например, в Славгородском районе – это святой источник, памятник природы республиканского значения – «Голубая криница».

В Столинском – древние деревянные церкви. В Ветковском – неглюбские рушники и музей народного творчества, включенный в «Золотое кольцо Гомельщины». В Быхове в Свято-Троицкой церкви хранится шедевр белорусской школы иконописи Барколабовская Матерь Божья Одигитрия. В Добруше есть старейшая бумажная фабрика, которую еще в 1870 году основал князь Паскевич. В Лунинецком районе в деревне Кожан-Городок растет пятивековой дуб Мицкевича и живут 49 семей аистов. На Краснопольщине есть построенная без единого гвоздя деревянная церковь. А брагинский метеорит имеет признанную в мире научную ценность. Достопримечательности районов представлены на сайтах райисполкомов.

– мифы о современной жизни и работе на пострадавших территориях (когда достигнутые и продолжающиеся перемены не сразу отражаются в общественном сознании, а стереотипные суждения об условиях жизнедеятельности и реалиях пострадавших территорий «застыли» в прошлом);

НА пострадавших территориях развито сельское хозяйство, кондитерская отрасль, легкая промышленность, нефтедобыча, производство цемента, метизов, мебели и др. Здесь производят нормативно чистую продукцию, которая пользуется популярностью не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.

В наиболее пострадавшей от чернобыльской катастрофы Гомельской области процент пожилых людей меньше, чем в «чистых» – Витебской и Минской. При этом в возрождающихся после катастрофы на Чернобыльской АЭС Столинском, Кормянском и Наровлянском районах в 2014 году уровень рождаемости стал самым высоким в республике, таким же, как в Брестском и Минском. В лидерах по показателю рождаемости также наиболее загрязненные Брагинский, Кормянский, Лельчицкий, Речицкий, Хойникский, Чечерский районы Гомельской области и Краснопольский, Славгородский, Чериковский районы Могилевской области.

Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».

Однако любая информация не лишена субъективности. Поэтому, если возникают какие-либо сомнения относительно тех или иных данных, то их всегда можно/нужно проверить. Преодоление мифов и стереотипов, не соответствующих реальности, является важным условием динамичного развития реабилитируемых районов и формирования в обществе объективной картины развития постчернобыльской ситуации в современной Беларуси. Одним из действенных механизмов их преодоления является серьезная информационная работа.

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии»; <http://www.rbic.by/>

СЕГОДНЯ главным направлением в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС является переход от реабилитации пострадавших районов к их **экономическому и культурному возрождению**. Одной из главных составляющих процесса возрождения является создание привлекательных условий для жизни на данных территориях. Акцент в реализации курса на возрождение — на молодежь.

Анализ современной ситуации показал, что и в настоящее время существуют значительные различия между районами. По основным направлениям и результатам социально-экономического развития их условно можно разделить на **три группы**:

1. Районы с развитой промышленной сферой, которые характеризуются высокими экономическими показателями. К ним можно отнести **Костюковичский, Луинецкий, Калинковичский, Речицкий** и др.
2. Районы, специализирующиеся, в основном, на сельскохозяйственном производстве или лесопользовании. Например, **Чериковский, Наровлянский, Ветковский, Краснопольский**.
3. Районы смешанного типа, где достаточно активно развиваются и сельскохозяйственное, и промышленное производство. Примеры таких районов — **Быховский, Добрушский, Столинский, Хойникский** и др.

МОЛОДЫЕ люди, приезжающие в пострадавшие районы, находятся в более выигрышном положении, нежели их сверстники, которые остаются работать в крупных городах или столице. Во-первых, они получают интересную работу по специальности с возможностью карьерного роста и прибавку к заработной плате. Во-вторых, власти районов предоставляют мо-

лодым специалистам служебное жилье, а если есть желание построить собственное, то и льготные кредиты.

Кроме того, в Беларуси проводятся масштабные меры по сохранению здоровья людей, проживающих на загрязненных территориях. Ежегодной спецдиспансеризацией охвачены все категории населения. Здесь особое внимание уделяется детям. Еще одна медицинская профилактическая мера, которую предоставляет государство, — это бесплатное оздоровление и санаторно-курортное

лечение. Например, в 2014 году было оздоровлено около 90 тысяч человек.

К сожалению, в пострадавших районах нет пока некоторых атрибутов больших городов, но государство делает многое для развития их инфраструктуры. Уже сегодня во многих населенных пунктах есть бассейны, тренажерные залы, библиотеки, работают различные художественные студии и спортивные секции.

Как в Беларуси преодолевают последствия Чернобыля

Для преодоления последствий чернобыльской катастрофы в Беларуси реализовано:

проекты по линии ПРООН, ЕС и ОБСЕ, объем финансирования – около **3,5 млн долларов США** и около **7 млн евро**

3 программы в рамках Союзного государства Беларуси и России, объем финансирования – около **92 млн долларов США**

4 национальные программы, объем финансирования – около **19,4 млрд долларов США**

Об основных результатах деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь, а также о планах по деятельности на будущее вы можете узнать на сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь;
<http://www.chernobyl.gov.by>

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Памятка подготовлена филиалом «Белорусское отделение
Российско-белорусского информационного центра по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
РНИУП «Институт радиологии» по заказу Департамента
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Рецензенты:

В. Л. Гурачевский, канд. физ.-мат. наук, доцент,
нач. центра по радиологии и качеству продукции сельского хозяйства
Белорусского государственного аграрного технического университета

Э. А. Надыров, канд. мед. наук, доцент,
зам. директора по научной работе Республиканского
научно-практического центра радиационной медицины
и экологии человека

Редактор А. С. Чаранкова
Дизайнер А. С. Куликова

<http://www.rbic.by/>
e-mail: info@rbic.by
тел.: 8 (017) 291-02-95
ул. Шпилевского, 59-7Н
220112, г. Минск, Республика Беларусь

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, 2015.

© РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь, 2015.

Отпечатано в филиале БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС
Республики Беларусь в рамках выполнения Программы совместной
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на период до 2016 года.

Тираж 250 экз. Заказ 1375.